


# ICTニュース3月 麻疹

2019年にも流行期ありましたが、世界での麻疹の流行が懸念され、海外渡航歴のある日本での患者も9名となりました。正しい情報を得て正しく対応しましょう



2000年からは2回接種が義務化となっています。麻疹は2回接種が抗体価獲得として求められています。しかし罹患歴も重要なポイントです。

1回接種のみの方は、(34歳～50歳未満)自分が麻疹の罹患歴を確認してください。

受診した患者様で疑わしい方には、ワクチン接種歴や罹患歴を確認してください。

**どんな症状?**

潜伏期間 10~12日

風邪に似た症状  
鼻水・咳・熱

感染力強!

口の中に白い斑点

全身に赤い発疹

7~10日発熱

しっかり回復まで 約1ヶ月

免疫低下

空気感染

発熱症状から発疹まで感染力が高い状況

**感染力強**

感染力が強く、免疫を持たない人にうつす割合は感染者1人当たり約12~14人。  
※インフルエンザは2~3人

手洗いやマスクでは防げません。

コプリック斑  
白いプツプツ

発疹

病日		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
病期	潜伏期 (10-12日)	カタル期		発疹期				回復期					
°C体温													
症状	カタル症状												
	コプリック斑 (頬粘膜)												
	発疹												